

بوتاکس چه کاربردهایی در زیبایی دارد؟

دکتر رامبد صمیمی تمام مواردی که نیاز به تزریق بوتاکس دارد را با ارائه توضیح و عکس عنوان کرده که شمارا به خواندن و دیدن آنها دعوت می‌کنیم.

- بوتاکس چه کاربردهای شایع دیگری دارد؟
- کاهش تعریق زیرغل
- درمان میگرون



کاربردهای بوتاکس ↓

- | | |
|--|---|
| I بهبود چین‌های پیشانی
تصویر ۲ | P بهبود خط اخم
تصویر ۱ |
| III کاهش عدم تقارن ابروها، بالا بردن گوشه ابروها و بهبود افتادگی ابروها، تغییر زاویه چشم‌ها و ایجاد چشم‌های مورب (چشم‌گربه‌ای) یا Jaguar's Eye
تصویر ۸ | IV کاهش پف پشت چشم‌ها
تصویر ۳ |
| V کاهش چین‌های گوشه چشم
تصویر ۴ | VI کاهش چین‌های روی بینی
تصویر ۷ |
| VII بهبود افتادگی گوشه لب‌ها
تصویر ۵ | VIII کاهش پستی و بلندی‌های چانه هنگام صحبت کردن
تصویر ۶ |
| IX بهبود افتادگی قسمت تحتانی صورت (لیفت نفر تی تی)
تصویر ۶ | X کاهش چین‌های عمودی گردن
تصویر ۶ |
| XI کاهش چین‌های عرضی گردن
تصویر ۶ | XII بالا بردن نوک بینی
تصویر ۶ |



بوتاکس چیست؟

بوتاکس شکل تغییرپذیر سم باکتری کلسستریدیوم بوتوکسینوم است. این باکتری به طور معمول باعث مسمومیت غذایی می‌شود اما با تغییر ساختمان این سم دارویی به نام بوتاکس به دست آمده است که فواید دارویی متعدد و روزافزونی دارد. بوتاکس در واقع اسم تجاری این دارو است که توسط شرکت آرگان آمریکا ساخته شود. در سایر کشورها این دارو به اسمی دیگری تولید می‌شود که معتبرترین آنها که در ایران موجود است، دیسپورت نام دارد که ساخته شرکت «ایپسن» انگلیس و مورد تایید FDA است. باید توجه کرد که دیسپورت اکنون در خود آمریکا بهترین دارو تلقی می‌شود و گوی سبقت را از بوتاکس آمریکایی ریوده است!

طول مدت اثر بوتاکس چقدر است؟

این مدت در افراد مختلف متفاوت است و بین چند هفته تا یکسال متغیر است که متوسط آن ۳ ماه است. البته باید مذکور شد که از زمان تزریق بوتاکس تجزیه دارو شروع می‌شود؛ بنابراین به تدریج اثر آن کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب منظور از مدت اثر بوتاکس فاصله بین زمان تزریق تازمان ختم اثر دارو، یعنی در انتها یک ماه اثر دارو از زمان شروع آن کمتر بوده و پس از دو ماه کمتر از اثر یک ماه پس از تزریق است.

تزریق بوتاکس در چه مواردی ممنوع است؟

اگر بیمار سابقه حساسیت مشخص به بوتاکس یا سابقه بیماری‌های عصبی عضلانی مثل میاستنی داشته باشد؛ همچنین در خانمهای باردار، در دوران شیردهی، با وجود عفونت فعلی در محل تزریق مثل وجود جوش چرکی مصرف بوتاکس توصیه نمی‌شود.